



# Operation/Zahnbehandlung

## Informationen für Operateur und Hämophiliepatienten

Empfehlung zur  ambulanten OP /  stationären OP

Bei \_\_\_\_\_, geb. am \_\_\_\_\_

liegt eine  Hämophilie A (Faktor VIII-Mangel)  
 Hämophilie B (Faktor IX-Mangel) vor.

Die Restaktivität beträgt: \_\_\_\_\_

Bei der Erbkrankheit Hämophilie handelt es sich um eine Blutgerinnungsstörung, bei der der Gerinnungsfaktor VIII bzw. IX vermindert ist und substituiert werden muss.

Ansonsten besteht bei operativen Eingriffen ein erhöhtes Blutungsrisiko.

### Bitte beachten Sie für den geplanten Eingriff:

- Der Eingriff sollte vormittags am Anfang der Woche erfolgen.
- Es liegt ein vom Hämophiliezentrum ausgestellter Substitutionsplan vor.
- Der Patient hat einen Notfallausweis. Dieser ist aktuell.

Die präoperative Faktorgabe erfolgt durch:

Patient/Angehörige  Hausarzt  Hämophiliezentrum  Anästhesist/Operateur

Es sollte eine maximale lokale Blutstillung bedacht werden.

Im Falle einer Blutung beachten Sie bitte die Angaben auf dem Substitutionsplan und halten Sie Rücksprache mit dem behandelnden Arzt im Hämophiliezentrum.

Name: \_\_\_\_\_ Telefonnummer: \_\_\_\_\_

### Schmerzmedikation: keine acetylsalicylsäure (ASS)-haltigen Medikamente verabreichen

Empfehlung zur Schmerzmedikation: \_\_\_\_\_

Die postoperative Faktorgabe erfolgt durch:

Patient/Angehörige  Hausarzt  Hämophiliezentrum

Sonstige: \_\_\_\_\_

Kontrolltermin vereinbart für den \_\_\_\_\_

Bemerkungen/Sonstiges: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Arzt-Stempel \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

Vielen Dank an die Arbeitsgruppe *Hämophilie kontrovers* für die Erarbeitung dieser Checkliste.

